

# Segunda evaluación de MAT 212, 2º semestre 2023

Eliseo Martínez

20 de noviembre de 2023

## Resumen

Se entregan los estándares que el estudiante debe cumplir, y para cada estándar está asociada el indicador de medición (la pregunta), de modo que si está correctamente resuelto tiene la observación de  $A$ , de lo contrario tendrá la observación de  $R$ , significando con ésto que debe reparar el estándar no cumplido. El desarrollo de estos indicadores debe ser manuscrito, y poner las hojas debidamente foliada en un archivador rápido, y entregarlo ANTES del día martes 28 de noviembre a las 08:30 horas, de lo contrario se entenderá que no realizó el trabajo.

## 1. Estándares para el concepto de derivada

1. El estudiante debe conocer el significado del concepto del cociente de Newton, esto es  $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$  para una función  $f(x)$
2. El estudiante debe saber la interpretación geométrica de la derivada en un punto de gráfica de  $y = f(x)$
3. El estudiante debe saber construir la recta tangente a la función  $f(x)$  en un punto  $(x_0, f(x_0))$  dado.

### 1.1. Indicadores para el concepto de derivada

- Dada la función  $f(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 35$ , donde  $t$  está tiene unidades de segundos, y  $f(t)$  en unidades de metros y  $g = 9,8 \frac{m}{seg^2}$ . Calcule la expresión

$$\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

Indique la unidad resultante de este cociente de Newton. Y entregue su significado<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Recuerde que es la función que mide el recorrido de un objeto que se deja caer libremente un objeto desde una altura de 35 metros

- Grafique la función  $f(x) = 3(x + 2)^2 + 3$ , e interprete en la gráfica la expresión

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

- Encuentre la ecuación de la recta que es tangente a la parábola anterior que pasa por un punto elegido por usted arbitrariamente de esa parábola. Grafique dicha recta junto a la parábola, e indique en el gráfico el punto seleccionado.

## 2. Estándares para la aplicación de derivadas

1. El estudiante debe saber resolver sencillos problemas de optimización
2. El estudiante debe saber construir modelos sencillos de ecuaciones diferenciales

### 2.1. Indicadores para la aplicación de derivadas

- Dado una cuerda de longitud  $L = 15$ , construya un triángulo isósceles de área máxima.
- Dada la función  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$  encuentre sus puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión.
- Dada la función

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-1/2 \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

encuentre su valor máximo y sus puntos de inflexión, donde  $\mu$  y  $\sigma > 0$  son constantes y  $-\infty < x < \infty$ .

- Suponga que  $N(t)$  indica el número de microorganismos en el tiempo  $t$ , y suponga además que el nacimiento de nuevos organismos es proporcional al número existente de organismos, digamos con constante de proporcionalidad  $\alpha$ . Supongamos que en el tiempo  $t = 0$  se inicia el proceso con 120 microorganismos, y al cabo de 25 segundos hay 135 microorganismos. Construya la ecuación diferencial que modela este crecimiento, encuentre el valor de  $\alpha$ , y calcule el número aproximado de microorganismos al cabo de 5 minutos.

## 3. Estándares para el cálculo de derivadas

El estudiante debe saber calcular la primitiva de una función, esto es si  $f(x)$  es una función tal que  $f'(x) = F(x)$  entonces se dice que  $f(x)$  es una primitiva de  $F(x)$

### 3.1. Indicadores para el cálculo de derivadas

Complete la siguiente tabla, realizando sus cálculos a manos y explicando con detalle

Primitiva, $f(x)$	Derivada, $F(x)$
?	$x^3 + 8x^2 + 2$
?	$\frac{1}{2}e^{-2x}$
?	$x^{-2}$
?	$4x + e^{-3x} + \frac{1}{x}$
?	$17x$
?	$\frac{5}{\sqrt{x}}$

Cuadro 1: Tabla de funciones y primitivas.